

Madariondoetarako gomendatutako tratamenduen gida 2017

Egoera fenologikoa	Izurria edo gaixotasuna	Gai eragingarria (intsektizida, fungizida edo...)	Merkatuko izenak	Oharrak
A	Zorriak / Psila / Erinosa	Olio parafinikoa	Hainbat	
A-B	Pikardura / Txankroak / Bakteriosia	Kobrea	Hainbat	
C-D	Pikardura / Txankroak / Bakteriosia	Kobrea (Dosi erdia)	Hainbat	
	Erinosa	Fenpiroximatoa Sufre bustigarria	Flash UM* Hainbat	*Gehienez tratamendu bat urtean zehar.
	Zorriak	Flukonamida Pimimikarba Tiakloprida	Tepeki Aphox, Kilsec Calypso SC	
G	Pikardura	M. Taldea: pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak		
		Difenokonazola* Fenbukonazola* Kresoxim-metila** Miklobutanila* Penkonazola* Tebukonazola* Tetrakonazola* Trifloxistrobina** Ziprodinila*** Ziprokonazola*	Score 25 EC, Lexor Impala Stroby WG, Discus Systhane Forte Topas 200 EW Folicur 25 WG Emerald Flint Chorus Atemi 10 WG	Jokaera mota: sistemikoak edo sarkorrak. Pikarduraren kasuan ondoaren bilakaera eragozten dute euriak hasi eta 36 eta 72 orduetara. Erresistentziak ekiditeko famili ezberdinak tartekatuta: *Triazolak: ergosterolaren biosintesiaren inhibitzaileak (I.B.E). **Estrobirulinak: arnasketa mitokondrialaren inhibitzaileak. ***Pirimidinak: aminoazidoen sintesia eraldatzen dabe.
	Monilia	MON. Taldea: moniliaren aurkako fungizidak.		
		Kaptana*+miklobutanila Kaptana*+ difenokonazola Metil tiofanatoa**	Merpan edo Orthocide + Systhane Forte Merpan edo Orthocide + Score 25 EC Topsin 70 WG**, Cercobin 50 SC**	* Ez erabili loraldian **Gehienez tratamendu bat urtean zehar.
	Stemphyliuma	S. Taldea: stemphyliumaren aurkako fungizidak.		
		Kresoxim-metila* Trifloxistrobina* Ziprodinil+Fludioxinila	Stroby WG*, Discus* Flint* Switch, Astound	*Pikardura ere kontrolatzen du.
Zorriak	Flonikamida Lambda-zihalotrina Pimetrozina	Tepeki Karate king Plenum		
+12 días	Pikardura	Pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
+12 días	Pikardura	Pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
+12 días	Pikardura	Pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
Fruitua aletu ondoren HARRAPAGAILUEN ARABERA.	Harrak jotzea Oharrak - telef. 94 406 68 79	Diflubenzurona Metoxifenozida Spinosada Tebufenozida Tiakloprida*	Dimilin 25 Runner Spintor 480 SC Mimic 2F Calypso SC*	*Zorriak eta psilak ere kontrolatzen ditu.
Landarearen hazkundera ZENBAKETEN ARABERA	Psila Oharrak - telef. 94 406 68 79	Abamektina Spirotetramat Tiakloprida*	Vertimec, Apache Movento Gold * Calypso SC*	*Zorriak eta harrak ere kontrolatzen ditu.
Fruituen hazkundera - Heltzea	Monilia	Moniliaren aurkako fungizidak. MON taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
	Pikardura	MOT Taldea: pikarduraren aurkako "stop" izaeradun fungizidak		
		Ditianona Klortalonila	Delan Pugil PM, Pugil GD	Jokaera mota: sarkorrak. Euria egin eta 36 ordu baino lehen egin behar da tratamendua
% 50eko hostoa jaustean	Pikardura	Kobrea + urea	Hainbat	Dosi nagusia: 100 litroko saldan 1kg. kobrea eta 10 kg.% 46ko urea.